

ရေယုန်

သင်သိရှိရန် လိုအပ်သည်များ

ရေကျောက် ဖြစ်စေသည့် မိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးတည်းမှ
ဖြစ်ပေါ်သည်။
(ဗာရီဆဲလာ ဇိုစတာ မိုင်းရပ်စ်/VZV)

ရေကျောက်ရောဂါမှ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသူ
မည်သူမဆို ကလေးများပင်လျှင် ရေယုန် ဖြစ်နိုင်သည်။

လက္ခဏာရပ်များ

- စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းခံစားခြင်း/ပူလောင် နာကျင်ခြင်း
- အရည်ကြည်ဖုပေါက်ခြင်း/အဖုအပိန့် တက်ခြင်း
- ယားယံခြင်း
- ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း
- အလင်းဒဏ်မခံနိုင်ခြင်း
- ခေါင်းကိုက်ခြင်း

စကဲန်ဖတ်ရန်



ရေကျောက် မပေါက်ဖူးသူများ သို့မဟုတ် ရေကျောက် ကာကွယ်ဆေး မထိုးထားသူများအနေဖြင့် ရေယုန်ရှိသူထံမှ VZV ဖြင့် ကူးစက်ခံရနိုင်သည်။



နှစ်ကြိမ်ထိုး ကာကွယ်ဆေး (၂-၆ လခြား) အသက် ၅၀ နှစ်အထက် လူကြီးများနှင့် ကိုယ်ခံအားစနစ် အားနည်းသည့် အသက် ၁၉ နှစ်အထက် လူများအတွက် အကြံပြု ထားသည်။

