

HERPES ZÓSTER

LO QUE DEBE SABER

ES CAUSADA POR EL MISMO VIRUS
QUE PROVOCA LA VARICELA
(VIRUS DE LA VARICELA ZÓSTER/VVZ).

CUALQUIER PERSONA QUE SE HAYA
RECUPERADO DE LA VARICELA PUEDE
CONTRAER HERPES ZÓSTER, INCLUSO
LOS NIÑOS.




SÍNTOMAS

- HORMIGUEO/ESCOZOR
- AMPOLLAS/SARPULLIDO
CON BULTOS
- PICAZÓN
- FATIGA
- SENSIBILIDAD A LA LUZ
- DOLOR DE CABEZA

ESCANEE



LAS PERSONAS QUE NUNCA TUVIERON VARICELA O
NO SE VACUNARON CONTRA LA VARICELA PUEDEN
CONTRAER EL VIRUS DE LA VARICELA ZÓSTER DE
ALGUIEN QUE TENGA HERPES ZÓSTER.



VACUNA DE DOS DOSIS (CON
UN INTERVALO DE 2 A 6 MESES)
RECOMENDADA PARA TODOS LOS
ADULTOS MAYORES DE 50 AÑOS
Y LAS PERSONAS MAYORES
DE 19 AÑOS CON SISTEMAS
INMUNITARIOS DEBILITADOS.

